

DIARREA AGUDA

Recién Nacido con diarrea de 1er., 2do. y 3er. grado no alimentados a pecho.

Recién Nacido alimentado a pecho con deshidratación de 2do. y 3er. grado.

Niños con deshidratación de 2do. y 3er. grado

Niños desnutridos severos, con diarrea (aunque no estén deshidratados).

Niños inmunocomprometidos con diarrea de cualquier grado.

Niños con diarrea prolongada, pese a haber recibido un tratamiento adecuado.

Niños con alto riesgo social, por pertenecer a un medio socio-económico muy deficitario, o tener padres poco confiables o tener hermanos fallecidos por diarrea.

Niños con diarrea con sangre.

Niños en que se sospeche la posibilidad de sepsis.

Niños enviados de otros centros sanitarios.

DIARREA CRÓNICA

Las crisis celíacas.

Las diarreas crónicas provenientes del interior para su diagnóstico, estudio y tratamiento.

Las diarreas crónicas que se acompañan de desnutrición o síndrome malabsortivo.

Las diarreas crónicas sin síndrome malabsortivo pueden ser estudiadas en consultorio externo.

Diarreas crónicas de niños de mal medio social, con padres poco confiables.

HEMORRAGIAS DIGESTIVAS

Niños con hematemesis, melenas y rectorragias.

HEPATITIS

Si son enviadas para su diagnóstico, estudio y tratamiento.

Si presentan elementos de insuficiencia hepatocítica.

DOLOR ABDOMINAL

Dolor abdominal, con distensión abdominal o alteraciones del tránsito que hagan sospechar la posibilidad de un cuadro quirúrgico, se ingresarán en observación.