

Se establecerán criterios de internación solamente para aquellas entidades nefrourológicas más frecuentes.

INFECCION URINARIA (IU)

(bacteriuria 100.000 col. x mm³)

El diagnóstico de I. U. con o sin síndrome urinario bajo o alto, no implica la necesidad de internación.

Se internarán:

- Recién Nacidos y lactantes con cuadro febril prolongado, sin foco aparente.
- Pacientes con uropatía malformativa conocida con fiebre más "proteinuria - piocituria".
- Niños preescolares, con fiebre, síndrome urinario y repercusión general.
- Ingresar al niño que por cualquier razón no pueda recibir el tratamiento por v/o y deba hacerse por vía parenteral.

HEMATURIA

- Hematuria total y macroscópica, en varias micciones. Con o sin síndrome urinario bajo o alto.
- Hematuria macro o microscópica, acompañada de dolor lumbar y/o abdominal tipo cólico.
- Hematuria y fiebre.
- Hematuria con sospecha de síndrome nefrítico agudo.

G.N.D.A. O SINDROME NEFRITICO AGUDO

- Todo paciente en el que se plantea un síndrome nefrítico agudo.
- Paciente con síntomas o signos de hipervolemia (hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca izquierda y/o encefalopatía hipertensiva).
- Edemas, oliguria y hematuria.
- Índices paraclínicos de falla renal.
- Oligoanuria más hematuria.

SINDROME NEFROTICO

- Siempre se ingresará el paciente en su primer empuje, a los efectos de confirmar el diagnóstico y efectuar el tratamiento.
- Edemas generalizados o anasarca.
- Infecciones intercurrentes más proteinuria masiva.
- Oligoanuria, edemas y proteinuria.
- Pacientes con difícil acceso al servicio de salud.
- Dificultad intelectual de manejar la medicación.

- Cualquier trastorno digestivo que impida el tratamiento por v/oral.
- Trastornos hidroelectrolíticos.
- Crisis nefrótica. No ingresan luego del segundo empuje, si tiene córtico-sensibilidad demostrada y fundamentalmente, si no hay elementos que planteen una descompensación rápida.

OTRAS CAUSAS

- Pacientes con cólico nefrítico.
- Paciente con renomegalia y que sea dificultoso estudiarlo en consulta externa.
- Paciente con renomegalia, hematuria y/o fiebre.